

eupnoičan, kardiorespiratorno stabilan te nema indikacija za hospitalizaciju i suportivno liječenje kisikom. Opušta se kući s preporukom mirovanja, primjerene dnevne hidracije, antipiretika po potrebi (paracetamol do 6x500 mg p.o.; kombinirati s ibuprofenom 3x400 mg p.o.), uvesti deksametazon 1x8 mg p.o. u terapiju tijekom 10 dana uz gastroprotekciju pantoprazolom 40 mg p.o.
Daljnja kontrola nadležnog liječnika, a infektologa prema kliničkoj indikaciji.

Naputak: pzz - Javiti se odabranom liječniku obiteljske medicine

Liječnik (Specijalizant):

Marija Livajić, dr.med. Doc.dr. sc. Đurđica Čekinović Grbeša, dr.med.

specijalizant infektologije
(8056323)

Liječnik:

infektolog
(0187844)

Datum izdavanja: 31.03.2021. 21:56

NAPOMENA: Umjesto propisanog lijeka izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite može propisati i drugi lijek istog razreda učinkovitosti u odgovarajuće jednakim dozama.

KOD SLIJEDEĆEG PREGLEDA MOLIMO DONIJETI OVAJ NALAZ