

306

## Kardiološka konzultacija

Protokol br. 2024002685

Pacijent : **DJANIĆ DAMIR**, rođen 26.09.1964  
PETRA PRERADOVIĆA 3, 33405 PITOMAČA

Datum pretrage : 10.07.2024

Uputna dijagnoza : Z95.2 - Prisutnost srčanog zaliska - proteze

### Nalaz i zaključak

Stanje nakon AVR mehanička (Carbomedics Reduced A 25) + CABGx3 (LAD - LIMA; PL, OM1 - VSM) - 23.03.2023.

Ishemijska bolest srca EF LV 50%

Stanje nakon Dehiscencije mjesta safenektomije na desnoj potkoljenici - rana zacijelila

Stanje nakon NSTEMI 21.12.2022

Arterijska hipertenzija

Šećerna bolest tip II - ovisna o inzulinu

Hiperlipidemija

KOPB

Aktivni nikotinizam

Bolesnik kardijalno kompenziran, u sinusnom ritmu. Uredan rad mehaničkog aortalnog zaliska. EF 50%  
Ergometrijsko testiranje (SBKT) 29.05.2024.:

elektrokardiografski granično pozitivan test koronarne pričuve kod postignutog opterećenja od 64% teoretskog maksimuma.

Bolesnik se žali na intoleranciju napora. Negira stenokardije. Na inzulinskoj terapiji.

EKG: sinusni ritam 62/min, LAH, uredna AV kondukcija, HLK.

RR: 105/55 mmHg

UZV srca: nalaz u prilogu.

Preporuča se terapija;

Andol 1x100 mg;

Martefarin prema vrijednostima PV-a i INR-a; Održavati PV 0,25-0,30 i INR 2,5-3,0.

Zoprax 1x40 mg prije doručka;

Concor Cor 1x1,25 mg ujutro;

Entresto 2x 24/26 mg

smanjiti Furosemid 1x20 mg ujutro;

Apleria 1x50 mg poslije ručka svaki drugi dan; terapiju započeti nakon kontrole Na i K;

Preductal MR 2x35 mg;

Jardiance 1x10 mg ujutro;

Tresiba 50 i.j.;

Aspartat inzulin 15-12-12 prije obroka,

Atoris 1x40 mg navečer uz kontrolu CK, hepatogram i lipidogram:

Zaldiar 37,5/325 mg po potrebi, protiv bolova.

Potrebna je profilaksa bakterijskog endokarditisa.

Kontrola ovdje za 6 mjeseci, uz uzv srca i ergometriju.

Kontrola lab. nalaza; elektroliti, bubrežne funkcije, HBa1C, KKS, jetrene probe, NT-proBNP, lipidogram.

Preporučuje se stroga apstinencija od nikotina te poštuda od težih psiho-fizičkih napora.

307

Liječnik :  
NIVES TODORIĆ , dr.med.  
(0160849)  
Kardiolog

NAPOMENA: Umjesto preporučenog lijeka izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite može propisati i drugi lijek istog razreda učinkovitosti u odgovarajuće jakim dozama.