



KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb
Odjel za onkologiju i radioterapiju
Voditelj: doc. dr. sc. Petar Suton, dr. med.
Onkologija i radioterapija – dnevna bolnica

OTPUŠNO PISMO DNEVNE BOLNICE

Protokol broj: 20260440434

ČUTURA BRANKO, rođen 02.01.1963. MBOO: 140502513
STROŽANAČKA 75, 21312 PODSTRANA
Datum pregleda: 11.09.2026.

Dijagnoze

C20 Zloćudna novotvorina završnog debelog crijeva (rektuma)

C20 Ca recti pT3N1b M +; panRAS wt. BRAF wt. *MSS/pMMR.*

C78.7 - Meta hepatitis multiplices

Karcinom rektuma uz samu dentatu

Nicotinismus

Op. 09.6.2026. KBD, dr. M. Kolovrat : Amputatio abdominoperinealis sec. Miles

PHD 10.6.2026. KBD: Materijal: 1. amputirani rektum s tn, Patohistološka dijagnoza:

1: Adenocarcinoma recti, pT3N1b; RR=R0; G2; LI +; VI +; PNI +; tm. depoziti +; I. čv. 2+/14; MMS/pMMR.

panRAS, BRAF testiranje naknadni nalazi (17.7.2026. Patologija KBD):

REZULTAT: U ovom uzorku nisu nađene mutacije KRAS gena.

REZULTAT: U ovom uzorku nije nađena nijedna navedena mutacija NRAS/BRAF gena.

- 15.7.2026. Implantacija port-katetera, Intervencijska radiologija KB Dubrava.

- Chemoth in tractu ppt. ca colonis metast. (CAPEOX od 17.7.2026. - ...)

Lijekovi: nihil

Alergije: negira

tm. markeri:

- 15.7.2026.: CEA=68.6 (<5.0); Ca 19-9=12 (<35); CYFRA 21-1=21.38 (<2.08); tPSA=1.46 (<5.0); LDH=1463 (<241).

- 08.9.2026.: CEA=55.3 (<5.0); Ca 19-9=13 (<35); CYFRA 21-1=9.6 (<2.08); tPSA=1.776 (<5.0); LDH=563 (<241).

Razlog prijema

11.9.2026.: nastavak onkološkog liječenja.

indikacija: metastatska bolest.

Danas dolazak na 3. ciklus kemoterapije po protokolu CAPEOX.

Za bolesnika pristigli i nalazi testiranja na panRAS i BRAF mutacije.

Za bolesnika će se od Povjerenstva za lijekove zatražiti odobrenje za primjenu anti-EGFR monokl. antitijela cetuksimab (Erbixux).

Anamneza

10.7.2026.: Bolesnik 1. puta u Dnevnoj bolnici Onkologiji (DBO) KB Dubrava.

Prethodno prikazan na MDT-u za tm. probavnog sustava 24.6.2026.

Obraden u drugoj ustanovi.

- predoperaciji MSCT abd. (12.5.2026. KBC): multipli sekundarizmi jetre.

NAPOMENA: Umjesto propisanog lijeka izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite može propisati i drugi lijek istog razreda učinkovitosti u odgovarajuće jednakim dozama.

Datum ispisa: 11.09.2026.

Status prilikom prijema

Pokretan, subjektivno dobro. Izvedbenog statusa ECOG 0 do 1.
TT=82 kg; TV=184 cm; BSA=2.05 m²; BMI=24 kg/m².

Kontrolni lab. nalazi (08.9.2026. KBC Split): Tr=110 (>158); SE=53 (<23); AST=55 (<38); GGT=217 (<55); LDH=563 (<241); ALP=193 (<142); CRP=10.2 (<5.0); feritin=598 (<400); CEA=55.3 (<5.0); CYFRA 21-1=9.6 (<2.08); drugo u ref. granicama.

Terapija

3. ciklus kemoterapije po protokolu CAPEOX.

Uputa izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite

Bolesniku se danas aplicira, nakon odgovarajuće premedikacije (Akynzeo kaps. p.o. (netupitant/palonosetron); 300 mg/0.5 mg) + dexamethason 8 mg i.v.), aplicira 1. ciklus gore navedene onkološke terapije.

CAPEOX: oksaliplatina (200 mg/500 ml 5% GLU/2h).

Bolesniku se trebaju izdati tablete kapecitabina od kolegice/kolege LOM. Npr. Kapetral a 500 mg. Započeti s uzimanjem od sutra.

Uzimati po 3 tablete ujutro i 3 tablete navečer unutar pola sata od doručka i večere: 1500 mg + 0 + 1500 mg.

Uzimati kroz 14 dana (sveukupno 84 tbl).

U slučaju bilo kakvog pogoršanja općeg stanja, febriliteta, proljeva, opće klonulosti, prekinuti uzimanje tableta kapecitabina i javiti se u hitnu službu najbliže bolnice (primjerice KB Dubrava).

Kod primjene oksaliplatine, izbjegavati kroz nekoliko narednih dana hladne napitke jer oksaliplatina kao nuspojavu ima i povećanu osjetljivost na hladnoću a može se izazvati i neugodan osjećaj stezanja u grlu. Kod kuće piti dosta tekućine.

U slučaju "blažih" proljeva uzimati: Seldiar (loperamidklorid) do 3x2 kapsule dnevno/5 dana !!!

Također bi u tom slučaju preporučio Vivomixx 1-2 vrećice na dan.

U slučaju zatvora uzeti Dulcolax čepić pp ili Portalak 2 žlice. Moguće i klizma.

U slučaju mučnine Reglan 10 mg tbl./Torecan supp. po potrebi (max. 3x dnevno).

Molim po LOM-u uvesti nadoknadu D vitamina.

Klizma u slučaju konstipacije.

Za bolji san npr. Sanval ili Praxiten x 1 tbl. navečer.

Druge (kasnije) tolerantne nuspojave moguće pojava afti u usnoj šupljini (terapija Gelclair na recept), suhoća sluznica, istanjenje do odebljanje kože s ragadama u području dlanova i tabana (palmo-plantarna reakcija). Nositi udobnu obuću, a od čarapa one s čim višim postotkom pamuka ili od čistog pamuka.

Naredni ciklus kemoterapije predvidiv za 3. tjedna 02.10.2026. petak oko 08 h.

Predvidivo uključenje i anti-EGFR monokl. antitijela cetuximab (Erbix).

Nadalje, bolesnik bi nakon primjene 4. ciklusa kemoterapije trebao napraviti reevaluacijski MSCT taz u ustanovi gdje je rađen i 1. MSCT taz (u KBC Split).

Pitanje metastazektomija (kod prim. dr. Marijana Kolovrata).

Imati svježe kontrolne laboratorijske nalaze, napraviti ih koji dan ranije:

KKS, CRP, SE, PV, INR, AST, ALT, GGT, ALP, LDH, CK, GUK, urea, kreatinin, eGFR, bilirubin uk, bilirubin konjug, lipaza, AMS, AMU, kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol; trigliceridi; Fe, UIBC, TIBC, feritin, Na, K, Cl, Ca, Mg; hsTnI/hsTroponin, proteini uk, albumin; vitamin D; vitamin B12, folna kiselina; urin.

NAPOMENA: Umjesto propisanog lijeka izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite može propisati i drugi lijek istog razreda učinkovitosti u odgovarajuće jednakim dozama.

Datum ispisa: 11.09.2026.

Liječnik specijalist:
prof. prim. dr. sc. Antonio Juretić, dr. med.
spec. onkologije i radioterapije
(0037125)

Prof. dr. sc. Antonio Juretić
specijalist radioterapije i onkologije
0037125